

## Istruzioni per il prelievo del campione

**Analisi:** ricerche antigeniche/colturali su feci (vedi elenco)

**Ricerche (codice mnemonico):**

- Clostridium difficile tossinogenico (CLOS)
- Rotavirus/Adenovirus (ROAD)
- Antigene di Helicobacter Pylori (HELAG)
- Candida (CANC)

**Sistema di raccolta/contenitore:**

- **Barattolo per feci con paletta**



**Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:**

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 06.300.11

**Dove consegnare dopo la raccolta:** in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

**Quando:** il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile.
- Trasferire con il cucchiaino una quantità sufficiente di feci nel barattolo (ca. grandezza di una noce); non riempire eccessivamente il contenitore!
- Se presenti, prelevare preferibilmente parti di feci contenenti sangue, muco o pus.
- Per feci liquide prelevare 3-5 ml con un cucchiaino.
- Riavvitare il coperchio chiudendo accuratamente il barattolo.

**Note:**

- *la ricerca di Clostridium difficile è indicata solo su campioni di feci liquide o semiliquide e non si esegue su campioni di pazienti di età inferiore ai 2 anni.*
- *per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e. coprocultura, parassiti) utilizzare i contenitori specifici!*