

Primario Dr. Paolo PRETTO Primararzt

BOZEN – Loew Cadonna Platz 12-Tel.0471 909600 Fax0471 909603
BRUNECK - Andreas Hoferstr. 25 Tel. 0474 586240
NEUMARKT - Bonatti Platz 1 - Tel. 0471 829255
MERAN - - Rossinistr. 1 - Tel. 0473 251380
SCHLANDERS – Krankenhausstr. 3 - Tel. 0473 735140
BRIXEN – Dante Str. 51 – Tel. 0472 813090

BOLZANO – Piazza L.Cadonna 12-Tel.0471/909600-Fax 909603
BRUNICO - Via Andreas Hofer 25 - Tel. 0474 586240
EGNA - Piazza Bonatti 1 - Tel. 0471 829255
MERANO - Via Rossini 1 - Tel. 0473 251380
SILANDRO - Via Ospedale 3 - Tel. 0473 735140
BRESSANONE – Via Dante 51 – Tel. 0472 813090

معلومات حول السُّل

ما هو مرض السُّل ؟

السُّل هو مرض معدٍ تسببه عُصيات. أنه يصيب الرئتين ولكن يصيب أيضاً الأجهزة الأخرى مثل الكلى، السحايا، الغدد اللمفاوية والعظام. هذا المرض يؤثر في الوقت الحاضر خصوصاً على الأشخاص المتقدمة في السن، لكنه يمكن أن يتطور في أي عمر، حتى إذا كان هناك ضعف مؤقت للجهاز المناعي.

كيف تنتقل العدوى ؟

العدوى تتم عادة من خلال استنشاق قطرات من لعاب يحتوي على عصيات من التي يتم إصدارها من خلال، الحديث أو عن طريق السعال. لا يمكن أن تنتقل من المريض بداء السُّل عن طريق، الملابس والبطانيات، وأكواب الشرب، وما إلى ذلك.

استنشاق العصيات يصل هذا أو هذه العُصيات إلى الرئتين عن طريق الجهاز التنفسي، حيث تتسبب عدوى أولية صغيرة دون أعراض، التي عادة ما تنتهي بالشفاء بعد مرور الوقت. بعد هذا الاتصال الأولي، يمكن للبكتيري البقاء كامنة لمدة أعوام ويتم التحكم فيها من قبل النظام المناعي. في حالات خاصة (على سبيل المثال في المرضى الذين يعانون من كبت المناعة) قد تتطور لديهم مرض السُّل حتى بعد مرور عدة سنوات بعد أول إصابة بهذا المرض.

ماهي الأعراض التي تحدد مرض السُّل؟

هذا يعتمد على نوع الإصابة. بالنظر إلى أن السُّل غالباً ما يصيب الرئتين، الأعراض التي يسببها هذا الداء هي:

- السُّعال الثَّابت (لمدة أسابيع أو أشهر)
- الحمى المتقطعة في فترة مابعد الظهر، وليست بمرتفعة
- التعرق في الليل لمدة فترات
- الدم في البلغم- ضعف وتعب
- فقدان الشهية- فقدان الوزن.

كيفية علاج مرض السل؟

إذا لم يعالج مرض السل بشكل صحيح يمكن أن تكون عواقبه جد خطيرة، ولكنة في أيامنا هذه يمكن تتبّع نصائح و دواء يمكنُ المريض بالشفاء كليا من هذا المرض. ويمكن أن يتم العلاج في المنزل مع استثناء بعض أخطار العدوى المحتملة. يستمر العلاج 6 أشهر على الأقل. وتتؤخذ هذا لأدوية في شكل أقراص مع وجود استثناءات قليلة. في الحالات الخفيفة والغير معدية يمكن للمريض، و بعد فترة من النقاهة، إستئناف عمله و نشاطاته، والاستمرار في العلاج المضاد للسل. عدم القدرة على العمل في أخطر الأحيان ومع إستمرار المصاب بالمرض، ممكن أن يستمر لعدة شهور. خلال العلاج، من المهم للغاية اتباع تعليمات الطبيب بدقة و حذر. إذا تم تغيير العلاج من قبل المريض بشكل مستقل أولا يؤخذ بشكل منتظم، يمكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للعلاج، لذلك يتم تأخير الشفاء أو أن تسوء حالة المريض تدريجياً.

كيف يمكنك الإحتياط من مرض السل؟

التدبير الوقائي الرئيسي هو العثور على مصدر العدوى في أقرب وقت ممكن، للعلاج والنهائي والقضاء على خطر الإصابة بالعدوى. ولذلك، ينبغي دائماً على المرضى الذين يعانون من الأعراض المذكورة أعلاه، وخاصة في حالة السُّعال المستمر يمكن فحصها من قبل طبيب مُختص. إذا كان هناك حالة من السل يجب الإ اتصال فوراً بالطبيب من أجل تدارك الموقف و الحد منه و ذلك عن طريق تشخيصه و الخضوع لاختبارات (فرز السلين واختبار الصدر بالأشعة السينية) للعثور على العدوى في الوقت المناسب، إن حدثت بالفعل العدوى، وعلى اتخاذ تدابير مناسبة لتجنب تطوير المرض.

الدكتور بولبريتو المسؤول الأول على المصححة
المساعدة الصحية/ الممرضة